

عفونت ادراری

بیمارستان امام حسین(ع) ارزوئیه



عنوان	عفونت ادراری
تهیه کننده	واحد آموزش سلامت
تایید کننده	کارگروه سلامت
سال تهیه	بهار ۱۴۰۵

عفونت دستگاه ادراری

عفونت ادراری یکی از شایع ترین بیماری ها و شکایات مراجعه کنندگان به اورژانس ها و نیز شایع ترین شکایت مرتبط با سیستم ادراری است و به معنای وجود میکروب در دستگاه ادراری می باشد . دستگاه ادراری شامل کل یه ها، مثانه و مجرای ادراری است. شایع ترین علت بروز عفونت ادراری، آلودگی با میکروب های مدفوعی است و در خانم ها ۴ برابر شایع تر از مردان می باشد . عفونت ادراری انواع مختلفی داشته، از بین آنها بروز عفونت مثانه بیشتر است.

عفونت ادراری چگونه اتفاق می افتد:

عفونت مجاری ادراری بوسیله میکروب (باکتری ها) ایجاد می شود. این باکتری ها می توانند باعث عفونت:

کلیه ها (پیلونفریت) - مثانه (سیستیت) - پروستات (پروستاتیت) گردند. بطور طبیعی مجرای ادراری عاری از هر باکتری

است. باکتری های مسبب ، اغلب از مقعد و یا واژن به پیشابراه و سپس به کلیه یا مثانه منتشر می شوند. این اختلالات بیشتر در خانم ها به علت کوتاه بودن پیشابراه است که به باکتری ها این اجازه را می دهد که به آسانی به سمت بالا حرکت کنند. بعضی اوقات باکتری ها از قسمت های دیگر بدن به دستگاه ادراری انتشار می یابند.

عوامل خطر برای عفونت مجاری ادراری:

۱- خانم بودن

۲- یائسگی ۳- افراد مسن ۴- مصرف کم مایعات

۵- اختلالات ساختمانی ادراری ۶- افراد دارای سوند یا لوله های

ادراری ۷- بیماری های مزمن زمینه ای مثل دیابت ۸- عوامل

انسدادی در دستگاه ادراری مثل سنگ های ادراری ۹- سطح پایین

بهداشت و عدم رعایت مناسب اصول بهداشتی ۱۰- بزرگی غده

پروستات در آقایان (ناتوانی در تخلیه کامل ادرار) ۱۱- چسبندگی

های رحمی و لگنی در خانم ها (اختلال در تخلیه ی کامل ادرار) -

۱۲- ادرار کردن با فاصله ی زیاد و عدم دفع به موقع به هنگام

احساس نیاز به دفع ۱۳- بیماری ها یا مصرف داروهایی که باعث

ضعف، ۱۴- نقص یا سرکوب سیستم ایمنی بدن شود. ۱۵- شستشوی

غلط ناحیه ی تناسلی پس از دفع ادرار و ۱۶- مدفوع (در خانم ها

جهت شستشو باید از سمت ۱۷- جلوه عقب باشد تا آلودگی

مدفو عی به مجرای ادرار منتشر نشود) ۱۸- بارداری

شرایط زمینه ساز:

۱. استفاده بیش از حد از داروهای آنتی بیوتیک
۲. قرصهای ضد بارداری خوراکی
۳. اختلال عملکرد دوره های ماهانه
۴. بارداری و زایمان
۵. انتقال بیماری های آمیزشی
۶. سایش و خراشیدگی و التهاب سطح اندام تناسلی
۷. ضعف سیستم ایمنی بدن

علائم عفونت ادراری شامل:

۱. بد بو شدن ادرار
۲. درد و سوزش هنگام ادرار کردن
۳. کدر شدن ادرار
۴. تکرر ادرار
۵. بی اختیاری ادرار
۶. احساس سنگینی در لگن و پایین شکم
۷. قطره قطره ادرار کردن
۸. شب ادراری
۹. احساس فوریت در دفع ادرار
۱۰. ترشح چرکی از مجرا

تشخیص:

تشخیص بر اساس شرح حال، وجود علائم، معاینه بالینی، وجود عوامل خطرو سابقه ی قبلی ابتلا خواهد بود.

آزمایش ادرار و کشت میکروبی (البته نه در همه موارد)

برای تایید تشخیص و تعیین آنتی بیوتیک مناسب

۱ هفته پس از پایان درمان جهت ۲- آزمایش مجدد ادرار

اطمینان از برطرف شدن عفونت بویژه در زنان حامله

نمونه گیری صحیح ادرار:

ابتدا ناحیه تناسلی را به خوبی و از جلو به عقب بشوئید محل را خشک نمایید. شروع به ادرار کردن نموده، ابتدای ادرار را دور بریزید. از وسط جریان ادرار به مقدار درخواست شده، ادرار در ظرف آزمایش، جمع آوری کنید.

درمان:

درمان ایده ال برای عفونت دستگاه ادراری استفاده از آنتی بیوتیک ها است که به شکل مؤثری باکتری های موجود در مجاری ادراری را از بین برده . برای عفونت های بدون عارضه ، رژیم های درمانی یک دوزی و یا رژیم های درمانی ۷-۱۰ روز استفاده می شود. برای عفونت های مزمن یا عفونت هایی که دوباره عود می کنند از رژیم های درمانی طولانی مدت استفاده می شود. صرف نظر از رژیم دارویی تجویز شده بیمار می بایستی حتی در صورت برطرف شدن علائم تمام دوزهای تجویز شده را مصرف کند.

نکات آموزشی ، توصیه های بهداشتی و پیشگیری:

۱. مایعات به ویژه آب زیاد بنوشید. میزان توصیه شده ۶ تا ۸ لیوان در روز است. (افراد با نارسایی کلیه با پزشک خود در این مورد مشورت نمایند)
۲. پس از اجابت مزاج ، شستن خود را از جلو به عقب انجام دهید. این کار عامل بسیار مهمی در پیشگیری از ورود میکروب از مدفوع به دستگاه ادراری می باشد.
۳. آنتی بیوتیک تجویزی را دقیقاً در زمان معین مصرف کرده، دوره درمان را کامل کنید.
۴. میوه و آب میوه ترش و حاوی ویتامین ث مثل مرکبات و آب پرتقال بیشتر مصرف کنید.
۵. به محض احساس نیاز به دفع ادرار، نسبت به تخلیه آن اقدام کنید. میکروب ها در ادراری که مدت بیشتری در مثانه بماند فرصت رشد و تکثیر پیدا می کنند.
۶. مصرف طولانی مدت آنتی بیوتیک در خانم ها گاهی ممکن است باعث تحریک بروز عفونت های قارچی زنانه شود، در صورت بروز خارش شدید و ترشح سفید رنگ در طی مصرف آنتی بیوتیک به پزشک معالج مراجعه نمایید و شخصا اقدام به قطع مصرف دارو نکنید.
۷. پس از پایان مقاربت جنسی اقدام به ادرار کردن نمایید تا میکروب های احتمالی از مجاری ادراری خارج شوند.